

# PARACETAMOL LIF

Paracetamol 500 mg

Comprimidos Vía Oral



Industria Argentina

Distribución Gratuita

## COMPOSICIÓN CUALI-CUANTITATIVA

Cada comprimido contiene:

Paracetamol gránulos DC 90% ..... 550 mg.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico. Antifebril.

## POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Paracetamol está indicado para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, menstruales, musculares) leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y reducir la fiebre.

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas.

Niños menores de 12 años: consulte con su médico.

Dosis máxima: 4 g/día (8 comprimidos de 500 mg).

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida al paracetamol. No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente.

El producto no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este producto debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior, por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica o sangrado gastrointestinal.

El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis.

La ingesta del paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

No ingiera otra especialidad medicinal que contenga paracetamol conjuntamente con este producto.

No tomar por más de 5 días si el dolor persiste o más de 3 días para la fiebre. Consulte a su médico.

Si usted está tomando algún medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de ingerir este producto.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

## **INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

Si usted toma anticoagulantes, anticonvulsivantes u otro antiinflamatorio consulte con su médico antes de ingerir este producto.

## **REACCIONES ADVERSAS**

Erupciones cutáneas, alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico.

## **SOBREDOSIFICACIÓN**

En caso de sobredosis accidental o si usted sospecha que se ha tomado una dosis mayor a la prescripta, de inmediato se debe conectar al médico o recurrir al hospital más cercano.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666/2247

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 / 4658-7777

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

## **PRESENTACIONES**

Paracetamol LIF se presenta en envases que contienen 800 comprimidos (Estuche hospitalario conteniendo 80 blísters de 10 comprimidos)

Otras: envases que contienen 10, 20, 50 comprimidos y 100, 250, 500, y 1000 unidades para uso exclusivo hospitalario.

## **CONSERVACIÓN**

Conservar a menos de 30°C, en su envase original y protegido de la luz.

**MANTENER ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## **POSOLOGÍA**

Ver prospecto adjunto.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Certificado N°54.235

## **LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.**

French 4950 - Provincia de Santa Fe - C.P. 3000

Tel.: 0342 4579233/31

Dirección Técnica: Farm. María Cecilia Selis - Matrícula Nacional N°: 12.024

Industria Argentina