

# IBUPROFENO LIF

IBUPROFENO 400 mg

Comprimidos vía oral

Industria Argentina

DISTRIBUCIÓN GRATUITA



## FÓRMULA UNITARIA

Cada comprimido contiene:

Ibuprofeno 400 mg

Excipientes c.s.p.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico. Antifebril. Antiinflamatorio.

Código ATC: M01AE01

## POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Ibuprofeno está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, dientes), dolores producidos por artritis, dolores asociados a estados gripales y para reducir la fiebre.

Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas mientras los síntomas persistan. Dosis máxima 1200 mg/día (3 comprimidos de 400 mg). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

Mayores de 65 años: consulte con su médico.

Niños menores de 15 años: consulte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

Alergia al Ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

-No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre.

-Si los síntomas continúan o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar al médico.

-Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

-Aunque el Ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

-La ingesta del Ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

-Consulte a su médico antes de tomar Ibuprofeno si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.

## Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. Deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

## REACCIONES ADVERSAS

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

## SOBREDOSIFICACIÓN

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCA NO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIERREZ: (011) 4962-6666/2247

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648/4658-7777

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

## PRESENTACIONES

Ibuprofeno LIF se presenta en envases que contienen 800 comprimidos (estuche hospitalario conteniendo 80 blísteres de 10 comprimidos)

Otras: envases que contienen 10, 15, 20, 21, 28,30, 40, 60 comprimidos y 100, 500 y 1000 comprimidos para uso exclusivo hospitalario.

## CONSERVACIÓN

Conservar a temperaturas menores de 30°C, en su estuche original y al abrigo de la luz.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Certificado N°55.576

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.

French 4950 - Provincia de Santa Fe - C.P.3000

Tel.:0342 4579233/31

Dirección Técnica: Farm.María Cecilia Selis - Matrícula Nacional N°12.024

Industria Argentina